

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 성분에 과민반응을 나타내는 사람
- 2) 심한 신기능장애 또는 간기능장애 환자
- 3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 항정신병약
- 2) 수면제(최면효과를 증가시킬 수 있다.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 요저류 문제가 있는 사람(증상이 나빠지거나 지속되면, 의사의 진찰을 받아야 한다.)
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 동물 기형에 대한 자료가 존재한다. 임상에서는 기형 또는 태아독성이 나타나지 않았지만 임신중에는 사용하지 않는 것이 바람직하다.
- 3) 수유부 : 모유로 이행되는 약에 관한 자료가 부족하다. 이 약은 모유 수유중에는 사용을 피해야한다.
- 4) 15일 이상 계속 복용하는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우
- 2) 과량섭취하여 설사, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 경우
- 3) 알레르기 반응이 나타날 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.